

PROTOCOL medisch-technische handeling



Venapunctie

| VOORBEREIDING | | JA | NEE |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 | Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 | Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, vacuümsysteem voor afname bloed, stuwband, deppers, pleister, onderlegger, zonodig alcohol 70% | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 | Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| UITVOERING | | JA | NEE |
| 5 | Laat de patiënt zitten op een stoel met armleuningen of liggen op een onderzoeksbank | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 | Laat de patiënt de arm ontbloten en deze op de onderlegger plaatsen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 | Maak het vacuümsysteem gebruiksklaar: leg de stuwband om de bovenarm en trek deze aan | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 | Doe niet-steriele handschoenen aan en zoek een geschikte ader in de elleboogholte | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 | Verwijder de beschermkap van de naald, laat de patiënt een vuist maken en prik met de naald in één keer in de ader | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | Houd de spuit zo vast dat deze via de vingers op de onderarm gefixeerd wordt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 | Schuif de vacuümbuis in de naaldhouder tot deze volgelopen is (maak de stuwband wat losser en laat de vuist ontspannen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 | Kantel elke vacuümbuis, na verwijderen uit de naaldhouder, voorzichtig volgens voorschrift | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 | Verwijder de stuwband na het laatste volle buisje | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 | Houd de depper op de insteekopening en trek de naald met een snelle beweging terug. Bij een actieve veilige naald moet het beschermkapje direct over de naald geklikt worden. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 | laat de patiënt de depper op de gestrekte arm enkele minuten stevig aandrukken | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 | Doe de naald zo snel mogelijk in de naaldencontainer | | |
| 17 | Verwijder de depper en dek het wondje af met een pleister (vraag zonodig naar overgevoeligheid) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| NAZORG | | JA | NEE |
| 17 | Ruim de materialen op de juiste manier op | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 18 | Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19 | Voorzie alle bloedbuizen van etiket met afnamedatum, naam en geboortedatum van de patiënt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20 | Noteer de gegevens in het EMD | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ALGEMEEN | | JA | NEE |
| 21 | Werk hygiënisch | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22 | Werk methodisch | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |