

Oefenvragen Hoofdstuk 12 – Endoscopische voorsteschedelbasischirurgie

Vraag 1 Hypofyse

Op welke 3 chirurgische manier kan de hypofyse benaderd worden?

Vraag 2 Benige uitstulping schedelbasis

Hoe heet de benige uitstulping van de schedelbasis waar de hypofyse is gelegen?

Vraag 3 Zenuwstructuur

Welke zenuwstructuur wordt snel bedreigd door zwelling van de hypofyse?

Oefenvragen Hoofdstuk 12 – Endoscopische voorsteschedelbasischirurgie

Vraag 4 **Transnasale benadering**

Welke 4 randapparatuur heb je nodig bij een transnasale benadering van de hypofyse?

Vraag 5 **Duradefect/liquorlekkage**

Na een “extended” benadering van de voorste schedelbasis zal zich bijna altijd duradefect/liquorlekkage voordoen.

Op welke manier kan dit defect afgedekt worden?

Feedback

Vraag 1 Hypofyse

- Via een craniotomie
- Endoscopisch via de neus
- Gecombineerd, zowel via een craniotomie als endoscopisch via de neus

Vraag 2 Benige uitstulping schedelbasis

Dit is de sella turcica (Turkse zadel).

Vraag 3 Zenuwstructuur

Het chiasma opticum.

Vraag 4 Transnasale benadering

- Camera en videotoren
- Spoelsysteem
- Navigatieapparatuur
- Boorapparatuur

Vraag 5 Duradefect/liquorlekkage

Een manier om dit defect af te dekken is een gesteelde mucoperichondriale lap af prepareren van het septum. Deze zwaailap wordt tegen het defect gelegd en met weefsellijm bevestigd. Een tampon zal als tijdelijke ondersteuning ertegenaan gelegd worden.